

# HOLUB DOUPŇÁK

(*Columba oenas*)

## Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: měkkozobí (*Columbiformes*)

Čeleď: holubovití (*Columbidae*)

Rod: holub (*Columba*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

## Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
  - současný populační trend: stoupající
- dle Červeného seznamu obratlovců ČR je to druh **zranitelný** (VU)

## Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **není možné** obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je holub doupňák řazen do kategorie **silně ohrožený druh**

## Popis

Peří je zbarveno převážně šedě s tmavými letkami a koncovou ocasní páskou, hrdlo je nahnědlé až vínové, zobák je zbarven dožluta. Na krku má zelenou skvrnu, kterou mladí ptáci postrádají. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Na rozdíl od podobného holuba hřivnáče nemá bílý kostřec ani bílý pásek okolo krku a bílou křídelní pásku.

## Rozšíření

Areál rozšíření zasahuje na většině území Evropy až po západní Sibiř. V severozápadní Africe je izolovaná populace. Jedná se o částečně tažného ptáka, zimoviště jsou v západní a jižní Evropě. V ČR se vyskytuje na většině území od nížin po hory do cca 1200 m.n.m., kde vyhledává zvláště bučiny.

**Biotop**

Hnízdí ve vzrostlých listnatých lesích, převážně bučinách, s vhodnými dutinami. Mimo období hnízdění se vyskytuje i v zemědělské krajině.

**Ekologie**

Hnízdí ve světlých listnatých lesích od března do září 2 až 3krát ročně v dutinách stromů. Hnízdo si vystýlá suchou trávou, větvičkami a listy. Samice snáší 2 bílá vejce, na kterých sedí kolem 16 dní oba rodiče. Mláďata hnízdo opouštějí po dalších 3–4 týdnech. Dospívají kolem 1 roku věku.

**Potrava**

Mezi jeho potravu patří semena a různé druhy bobulí.