

HRDLIČKA ZAHRADNÍ (*Streptopelia decaocto*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: měkkozobí (*Columbiformes*)

Čeleď: holubovití (*Columbidae*)

Rod: hrdlička (*Streptopelia*)



V ČR druh **NEPŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
 - současný populační trend: stoupající

Ohrožující faktory

Nejsou zatím známy žádné zásadní ohrožující faktory.

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **je možné obhospodařovat lovem**
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu je možné hrdličku lovit od 16. října do 15. února

Popis

Hrdlička velikostně odpovídá holubu domácímu (váží kolem 120 až 290 g). Je zbarvena plavě hnědě s jedním černým proužkem na šíji. Letky jsou tmavé a na konci ocasních per má bílý proužek. Samec a samice se od sebe neliší, mlád'atům chybí černý proužek na šíji nebo je velmi jemný.

Rozšíření

Původním areálem tohoto druhu je jihozápadní až střední Asie. Počátkem minulého století se však začala přes Turecko šířit na Balkán. V současnosti je rozšířena takřka na celém území Evropy (mimo severu a severovýchodu). Vyskytuje se i na severu Afriky a vysazena uměle byla v Severní Americe.

Biotop

Hnízdí na celém území od nížin až do hor.

Ekologie

Početně hnízdí od března až do září především v zahradách a parcích. Hnízdo si staví na stromech nebo budovách, vypadá jako plochá kupka větviček. Oba rodiče sedí na vejcích 14-16 dnů, poté mláďata cca 20 dní krmí na hnízdě a ještě asi 3 týdny dokrmují. Jedná se o stálého ptáka.

Potrava

Potravou jsou semena, bobule a části rostlin.