

# HUSA POLNÍ (*Anser fabalis*)

## Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: vrubozobí (*Anseriformes*)

Čeleď: kachnovití (*Anatidae*)

Rod: husa (*Anser*)

V ČR druh **PŮVODNÍ**

## Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově málo dotčený druh (Least Concern - LC)
  - současný populační trend: klesající

## Ohrožující faktory

Ohrožena především intenzivním lovem a ztrátou habitatu.

## Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který je možné obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu je možné husu polní lovit od 16. srpna do 15. ledna

## Popis

Velikostí je o něco menší než husa domácí (váha 1700 až 4000 g). Je tmavší než husa velká, a to především na hlavě a krku. Na zádech je nápadné příčné pruhování. Přední část křídel je v letu tmavá. Zobák je u kořene černý a zbylá část je žlutá s černým nehem na konci. Končetiny jsou oranžovožluté. Samec a samice se neliší, mladí jedinci mají nohy šedožluté, svrchní část těla šedočernou a spodní žlutou.

## Rozšíření

Vyskytuje se v tajze a tundře Palearktidy. Jedná se o tažný druh, zimuje v západní, střední a jižní Evropě a na východě Asie. Na našem území zimuje na Novomlýnských nádržích a jihočeských rybnících.

## Biotop

Hnízdí na rašeliništích, mokřadech a jezírkách v tajze nebo vlhké tundře v závislosti na poddruhu.

## **Ekologie**

Hnízdění probíhá v květnu až červnu jednou za rok. Hnízdem je kotlina vystlaná trávou a mechem. Samice snáší v průměru 5 špinavě bílých vajec, na kterých sedí sama kolem 28 dní. Nekrmivá mláďata vodí oba rodiče 2 měsíce. Na zimoviště odlétá v říjnu a vrací se počátkem března.

## **Potrava**

Potrava je výhradně rostlinná, živí se především trávami.

