

# KOČKA DIVOKÁ (*Felis silvestris*)

## Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: savci (*Mammalia*)

Řád: šelmy (*Carnivora*)

Čeleď: kočkovití (*Felidae*)

Rod: kočka (*Felis*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

## Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
  - současný populační trend: klesající
- dle Červeného seznamu obratlovců ČR je to druh **kriticky ohrožený** (CR)

## Ohrožující faktory

Ohrožujícím faktorem je křížení s kočkou domácí, ztráta přirozeného prostředí, střet s automobily a nelegální odstřel.

## Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **není možné** obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je bobr evropský řazen do kategorie **kriticky ohrožený druh**

## Popis

Jedná se o velmi vzácnou šelmu České republiky. Lze si ji snadno splést se zdivočelou mourovatou kočkou domácí. Jejich odlišení může být značně náročné. Kočka divoká je mohutnější s menšíma ušima a se silným ocasem, který má 3 až 4 příčné pruhy. Ve zbarvení převládá šedohnědý až šedožlutý odstín, středem hřbetu se táhne tmavý pruh končící u kořene ocasu. Na hlavě má 4 delší pruhy a jeden kratší mezi nimi, pruhů je celkově méně než u kočky domácí.

## Rozšíření

Původně se vyskytovala souvisle od britských ostrovů do střední Asie a severní Afriky. Nyní je výskyt ostrůvkovitý. V Čechách byla původní populace vyhubena na přelomu 18.

a 19. století, později se objevovali pouze zatoulaní jedinci z okolních států. V letech 2011-2016 se na našem území podařilo získat několik důkazů o výskytu kočky divoké ze záznamů z fotopastí (Šumava, Javorníky, Bílé Karpaty, Český les).

### **Biotop**

Vyskytuje se především v listnatých a smíšených lesích pahorkatin a vrchovin, méně často v nížinách. Důležitý je výskyt vhodných úkrytů, jako jsou skalní rozsedliny, dutiny starých stromů, opuštěné liščí a jezevčí nory.

### **Ekologie**

Jedná se o samotářské zvíře, aktivní především za soumraku a v noci. Páření probíhá na přelomu zimy a jara. Samice je březí 65 dní a rodí 3 až 5 mláďat v období od dubna do června. Osamostatňují se na podzim, pohlavně dospělá jsou v roce života.

### **Potrava**

Převážně se živí malými hlodavci, dále ptáky, králíky, ještěrkami nebo žábami.

