

KOPŘIVKA OBECNÁ

(*Anas strepera*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: vrubozobí (*Anseriformes*)

Čeleď: kachnovití (*Anatidae*)

Rod: kachna (*Anas*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
 - současný populační trend: stoupající
- dle Červeného seznamu obratlovců ČR je to druh **zranitelný** (VU)

Ohrožující faktory

Ohrožena devastací biotopů lidskou aktivitou.

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **není možné** obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je kopřivka obecná řazena do kategorie **ohrožený druh**

Popis

Kopřivka obecná je o něco menší než kachna divoká. Obě pohlaví jsou zbarvena hnědě, samec je světlejší. Ve svatebním šatě je samec zbarven převážně šedě, hlava je světlá, zobák a kostřec tmavý, zrcátko je výrazně bílé a dobře viditelné za letu. Samice má zobák nažloutlý a narozdíl od samice kachny divoké nemá světle modré zrcátko, ale bílé.

Rozšíření

Kopřivka obecná žije na rozsáhlém území Evropy, Asie a Severní Ameriky. Vyskytuje se v nižších až středních polohách mírného pásu po Středomoří. U nás se vyskytuje po celém území v nižších a středních polohách, nejpočetněji však v jihozápadních a východních Čechách a na jižní Moravě. V posledních desetiletích byl zaznamenán vzrůst početnost.

Biotop

Hnízdí v prostředí stojatých vod i v okolí lagun s mořskou, nebo brakickou vodou.

Ekologie

Kopřivka obecná preferuje větší vodní plochy, vlhké pastviny nebo močály s hustým vegetačním porostem. Je zpravidla samotářská nebo žijící v párech, při migracích a hnízdění se často shlukuje do menších skupin. Hnízdo si staví na zemi ukryté v porostu rákosů nebo jiných vodních rostlin. Snáší obvykle 7 až 13 lehce nažloutlých vajec, na kterých sedí oba rodiče po dobu 26 dní. Mláďata jsou nekrmivá.

Potrava

Živí se převážně vodními rostlinami, v létě také vodním hmyzem. Můžeme ji vidět paběrkovat v letních měsících i na obilných polích.