

LŽIČÁK PESTRÝ

(*Anas clypeata*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: vrubozobí (*Anseriformes*)

Čeleď: kachnovití (*Anatidae*)

Rod: kachna (*Anas*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
 - současný populační trend: klesající
- dle Červeného seznamu obratlovců ČR je to druh **kriticky ohrožený** (CR)

Ohrožující faktory

Počty jedinců jsou snižovány především nemožností hnízdit kvůli ničení vhodných biotopů (odvodňování podmáčených míst) a ztrátou hnízdišť, dále lovem a vybíráním hnízd. Jedním z faktorů jsou i úhyny po nárazu do vedení elektrického napětí.

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **není možné** obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je lžičák pestrý řazen do kategorie **silně ohrožený druh**

Popis

Lžičák pestrý je plovavá kachna a velikostí se podobá kachně divoké. Název je odvozen od lžicovité rozšířeného zobáku. Samec má ve svatebním šatu hnědé boky, bílou hrud' a zelenou, kovově lesklou hlavu. Samice je zbarvena podobně jako samice kachny divoké.

Rozšíření

Lžičák pestrý je široce rozšířená kachna. Hnízdí v severních oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky a ojediněle se také vyskytuje v Austrálii. Většina populace se vyskytuje v severním a mírném pásu Ruska, zbytek pak především

v Nizozemí a Finsku. Pravidelně, ale nepočetně hnízdí (140–200 párů), protahuje a ojedinele i zimuje (10–60 jedinců) na našem území.

Biotop

Typickým prostředím lžičáka jsou mělké rybníky, nepříliš zarostlé bažiny, rybníky přecházející v pastviny a zaplavované louky v nížinách.

Ekologie

Mimo hnízdní období se sdružuje do menších hejn. Hnízdí na ostrůvcích v třtině a ostřicových porostech poblíž vody. Samice snáší 8 až 12 zelenošedých vajec v květnu až červnu, na kterých sedí 22 až 25 dní. O mlád'ata, která jsou nekrmivá, pečuje pouze samice a vodí je ještě zhruba 7 týdnů.

Potrava

Živí se převážně rostlinnou potravou, avšak v období hnízdění požívá také drobné živočichy (vodní hmyz, koryše a měkkýše).