

PERLIČKA OBECNÁ

(*Numida meleagris*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: hrabaví (*Galliformes*)

Čeleď: perličkovití (*Numididae*)

Rod: perlička (*Numida*)



V ČR druh **NEPŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově málo dotčený druh (Least Concern - LC)
 - současný populační trend: stabilní

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který je možné obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu je možné perličku obecnou lovit od 16. října do 31. prosince

Popis

Perlička je poměrně plachý pták a velmi ostražitý. Její zavalité tělo je černé, bíle kropenaté. Má malou hlavu, která je neopeřená se žlutohnědou přílbicí, hlava i strany krku jsou modře zbarveny. Ocasní pera jsou krátká, křídla zakulacená.

Rozšíření

Původní areál výskytu je Afrika jižně od Sahary a severozápad Maroka, V současné době se chová po celém světě.

Biotop

Perličky obývají různá prostředí, od okraje lesů přes savany, buše a polopouště.

Ekologie

V době mimo hnízdění se shlukují do hejn čítajících i stovky jedinců. Zdržuje se převážně na zemi a útěk upřednostňuje před letem. Vajíčka snáší samice do hnízda na zemi, v průměru jich bývá 6 až 12. Inkubace trvá 24 až 28 dní, poté samice mlád'ata vodí a za

měsíc jsou schopna letu. Domestikací perličky obecné vznikla perlička domácí (*Numida meleagris* f. *domestica*).

Potrava

Živí se převážně rostlinnou potravou (travinami, semeny, kořínky, plody), částečně i živočišnou (hlemýždi, hmyz, pavouci, obojživelníci).