

# POLÁK VELKÝ (*Aythya ferina*)

## Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)


Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: vrubozobí (*Anseriformes*)

Čeleď: kachnovití (*Anatidae*)

Rod: polák (*Aythya*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

## Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově zranitelný druh (Vulnerable - VU)
  - současný populační trend: klesající

## Ohrožující faktory

Lidská činnost, lov, chemizace a intenzivní zemědělství, ubývání vhodných biotopů.

## Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který je možné obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu je možné poláka velkého lovit od 1. září do 30. listopadu

## Popis

Samec poláka velkého je ve svatebním šatu typicky zbarvený: hnědo rezavá hlava s modrošedým zobákem, černý krk a hrud', šedé tělo a černý konec těla. Samice jsou šedavě tmavohnědé s nažloutlou kresbou kolem očí a zobáku. Samci jsou v prostém šatu podobní samici, pouze s rezavějším nádechem.

## Rozšíření

Vyskytuje se na většině území Evropy až do střední Asie.

## Biotop

Preferuje rybníky, jezera, řeky s hustým podrostem na březích.

## **Ekologie**

Polák velký se vyskytuje v hejnech, často společně s jinými druhy kachen. Velmi dobře se potápí. Hnízdí od dubna do června, hnízdo je ukryté v porostech blízko u vody. Samice snáší 5 až 18 vajec (často i do jiných hnízd, například poláka chocholačky), na kterých sedí sama až 28 dní. Mláďata jsou během prvního dne odvedena na vodu. Plně samostatná jsou až po 7 – 8 týdnech. V ČR se vyskytuje celoročně.

## **Potrava**

Převažuje rostlinná složka (mladé výhonky, pupeny, semena a ostatní vegetační části rostlin). Potrava živočišná zahrnuje měkkýše, hmyz, larvy hmyzu, koryše i malé rybky.