

# RACEK CHECHTAVÝ

## (*Larus ridibundus*)

### Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: dlouhokřídlí (*Charadriiformes*)

Čeleď: rackovití (*Laridae*)

Rod: racek (*Larus*)



V ČR druh **PŮVODNÍ**

### Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově **málo dotčený druh** (Least Concern - LC)
  - současný populační trend: neznámý
- dle Červeného seznamu obratlovců ČR je to druh **zranitelný** (VU)

### Ohrožující faktory

Ohrožený ropnými skvrnami na vodních plochách. V minulosti v některých areálech docházelo k odebírání vajec z hnízd a v současnosti je ohrožen především snížením reprodukční schopnosti kvůli kontaminaci chemickými polutanty.

### Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který **není možné** obhospodařovat lovem

### Popis

Jedná se o nejběžnějšího evropského zástupce rackovitých. Patří mezi malé druhy racků (dosahuje hmotnosti kolem 300 g). Je štíhlý, běháky jsou zbarveny oranžově až červeně, břicho je bílé, ocas, hrdlo a křídla svrchu světle šedá, konce jsou černé. V létě je hlava zbarvena dohněda. V zimě je bílá s jednou černou skvrnou za okem. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Mladí ptáci mají hnědá křídla, tmavý ocas a v létě méně viditelné hnědé opeření na hlavě.

### Rozšíření

Hnízdí v mírném pásu Evropy a Asie od Velké Británie po Kamčatku. V současnosti hnízdí i na Islandu, v Grónsku a v Kanadě, kam ve 20. století rozšířil svůj areál. V minulosti byl na území Česka početně hnízdícím druhem, především v jižních Čechách. V druhé polovině 19. století se jeho početnost snížila. Od první poloviny 20. století se začala početnost racků chechtavých na českém území znovu rapidně zvyšovat.

V současnosti je však zase stav populace nízký a stále ubývá. Naše největší kolonie se nachází na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny na jižní Moravě.

### **Biotop**

Je typickým obyvatelům mořských i vnitrozemských pobřeží.

### **Ekologie**

Racek chechtavý hnízdí v koloniích, především u rybníků se zarostlými břehy nebo u slepých říčních ramen a v bažinách. Hnízda jsou umístěna ve vegetaci na zemi nebo v mělké vodě. Samice do něj v období od dubna do června klade obvykle 3 špinavě bílá až nazelenalá vejce, na kterých sedí 20 až 24 dní. O mláďata pak pečuje 35–42 dnů. Pohlavně dospívají kolem dvou let.

### **Potrava**

Větší část potravy tvoří živočišná složka, jako je hmyz a jiní bezobratlí, dále pak drobné rybky. Občas konzumuje i části rostlin, v zimě pak především odpadky.

