

STRAKA OBECNÁ (*Pica pica*)

Taxonomie

Říše: živočichové (*Animalia*)

Kmen: strunatci (*Chordata*)

Třída: ptáci (*Aves*)

Řád: pěvci (*Passeriformes*)

Čeleď: krkavcovití (*Corvidae*)

Rod: straka (*Pica*)

V ČR druh **PŮVODNÍ**

Stupeň ohrožení

- dle IUCN: celosvětově málo dotčený druh (Least Concern - LC)
 - současný populační trend: stabilní až vzestupný

Legislativa

- dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se jedná o druh, který je možné obhospodařovat lovem
- dle Vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu je možné straku obecnou lovit od 1. července do konce února

Popis

Pohlavní dimorfismus není patrný, obě pohlaví jsou stejně zbarvena. Hlava, krk a horní část hřbetu jsou černé, lopatky, dolní část hřbetu, prsa, břicho a kostřec naopak bílé. Ocasní pera jsou dlouhá a stupňovitá. Rýdovací pera jsou kovově lesklá, s modrou lesklou špičkou.

Rozšíření

Vyskytuje se v celé Evropě, v severní Africe a ve větší části Asie až po Kamčatku. Jedná se převážně o stálý druh. V ČR je rozšířena rovnoměrně od nížin (kde je hojnější) až do hor kolem 800-900 m. n. m.

Biotop

Nejčastěji se vyskytuje tam, kde se střídá otevřená krajina a pole s lesíkem nebo skupinou stromů. Souvislým lesním porostům se vyhýbá. Často se vyskytuje v blízkosti lidských sídel, kde může i hnízdit.

Ekologie

Hnízdo si staví vysoko ve stromech, v křovinách, někdy i nízko nad zemí ze suchých větví, hlíny a drnů. Vnitřek vystýlá listím. Nad hnízdem je stříška z větví. Jedenkrát za rok snáší samice v průběhu března až června kolem 6 vajec, na kterých sedí zhruba 18 dní. Oba rodiče pak mláďata krmí 22 až 27 dní. Do příštího jara se drží s rodiči. Je známa pro zálibu odnášet lesklé předměty.

Potrava

Živí se velmi rozmanitou potravou, od hmyzu, pavouků, měkkýšů, obojživelníků, mláďat a vajec jiných ptáků (kosů, pěnkav, sýkor...), až po rostlinnou stravu zahrnující obilí, semena a bobule. Konzumuje také uhynulá zvířata.

